

ATTENTION : Risque potentiel d'erreur d'administration avec Bortezomib EG 2.5 mg/ml, solution injectable

POUR ADMINISTRATION SOUS-CUTANEE (SC) OU INTRAVEINEUSE (IV)

ADMINISTRATION SOUS-CUTANEE

Aucune dilution nécessaire

Concentration de la solution prête à l'emploi :
2.5 mg/ml

ADMINISTRATION INTRAVEINEUSE

Ajouter **2.1 ml** de NaCl 0.9%

Concentration de la solution diluée :
1 mg/ml

- ◀▶ Bortezomib EG doit être administré par un professionnel de santé, en observant des techniques aseptiques strictes car aucun conservateur n'est présent. Pour l'administration IV, le flacon de Bortezomib EG doit être dilué avec précaution à l'aide d'une seringue de taille appropriée, sans enlever le bouchon du flacon.
- ◀▶ Bortezomib EG 2.5 mg/ml est sans conservateur et doit être utilisé immédiatement après sa préparation. Cependant, la stabilité chimique et physique de la solution a été démontrée pour une durée de 8 heures à 25°C dans le flacon d'origine et/ou dans une seringue. **La durée de conservation totale du médicament ne doit donc pas dépasser 8 heures avant administration.**
- ◀▶ Il n'est pas nécessaire de protéger de la lumière le médicament.
- ◀▶ **Afin d'éviter les erreurs d'administration, les seringues pour l'administration SC et IV doivent être étiquetées différemment.**
- ◀▶ **Voie sous-cutanée ou intraveineuse uniquement. Ne pas administrer par d'autres voies.**
- ◀▶ Pour plus d'informations, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit des spécialités à base de bortézomib sur la base de données publique des médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>.
- ◀▶ Déclarez tout effet indésirable au Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) dont vous dépendez. Vous pouvez aussi déclarer les effets indésirables ou tout risque d'erreur médicamenteuse sur www.signalement-sante.gouv.fr. Pour plus d'information, consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet de l'ANSM : <http://ansm.sante.fr>.