

**IMPORTANT - CARTE DE MISE EN GARDE**  
**ABACAVIR/LAMIVUDINE EG 600 mg/300 mg comprimé pelliculé**  
**(abacavir/lamivudine)**

**Conservez cette carte sur vous en permanence**

ABACAVIR/LAMIVUDINE EG contient de l'abacavir. Certains patients prenant ABACAVIR/LAMIVUDINE EG peuvent développer une réaction d'hypersensibilité (réaction allergique grave) qui peut menacer le pronostic vital en cas de poursuite du traitement. **CONTACTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN qui vous indiquera si vous devez arrêter de prendre ABACAVIR/LAMIVUDINE EG si :**

**1) Vous présentez une éruption cutanée OU,**

**2) Vous présentez des symptômes appartenant à au moins DEUX des catégories suivantes :**

- fièvre ;
- essoufflement, mal de gorge ou toux ;
- nausées ou vomissements ou diarrhée ou douleurs abdominales ;
- fatigue sévère ou courbatures ou sensation de malaise général.

Si vous avez arrêté le traitement par ABACAVIR/LAMIVUDINE EG en raison de cette réaction, **VOUS NE DEVEZ JAMAIS REPRENDRE** ABACAVIR/LAMIVUDINE EG, ni tout autre médicament contenant de l'abacavir (tel que Ziagen, Triumeq ou Trizivir) car cela peut entraîner, **dans les heures qui suivent**, une chute de votre pression artérielle menaçant le pronostic vital, voire le décès.

**(voir au verso)**

Contactez immédiatement votre médecin si vous suspectez une réaction d'hypersensibilité à ABACAVIR/LAMIVUDINE EG. Notez ci-dessous les coordonnées de votre médecin :

Docteur : ..... Tél. : .....

**En cas d'absence de celui-ci, vous devez contacter immédiatement un autre médecin pour un avis médical (par exemple le service des urgences de l'hôpital le plus proche).**

Pour les demandes d'informations générales concernant ABACAVIR/LAMIVUDINE EG, contactez :

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics - Tél. 01 46 94 83 00